

ООО «Центр цифровой рентгенодиагностики Сальвадор»

ПАМЯТКА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗА:

Этот документ свидетельствует о том, что мне в соответствии со ст.ст. 19-23 Федерального закона N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" сообщена вся необходимая информация о моем лечении и рекомендации по уходу.

Рекомендации:

Постоянно носить протез, даже ночью для достижения максимального эффекта привыкания в возможно короткие сроки.

Явиться на первую коррекцию на следующий день после сдачи протеза, далее по показаниям (не чаще одного раза в три дня). Период адаптации может длиться до 1,5 месяцев и больше.

Боль, отек, травмирование слизистой – это не дефект протеза, а неизбежный этап привыкания живого организма к инородному телу (протезу), просим относиться к этому с пониманием.

При появлении болей в области тканей протезного ложа, связанных с травмой слизистой оболочки - немедленно прекратить пользоваться протезом, явиться на прием к врачу, возобновив пользование протезом за 3 часа до посещения врача.

При травматическом повреждении слизистой оболочки, образовании язв, участки протеза в этих местах необходимо минимально сошлифовывать базис при очередной коррекции. Коррекцию базиса протеза проводят до появления первого субъективного ощущения уменьшения болевого синдрома.

Назначается медикаментозная терапия противовоспалительными средствами и средствами, ускоряющими эпителизацию слизистой оболочки рта (местно: солкосерил, витамины и т.д.) – она обязательна для скорейшего получения положительного эффекта

Замена матриц замковых креплений и перебазировка с периодичностью 1 раз в 6 месяцев является обязательной, иначе протез может сломаться или травмировать слизистую, а также привести к подвижности и утрате опорных зубов.

Подпись пациента: _____/_____

Врач _____/_____

Дата «___» ___20__ г.